

Graphen und Matrizen

Graphen

Ein Graph $G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ besteht aus

- ▶ eine Menge von **Knoten** $i \in \mathcal{V}$ (engl. *vertex*)
- ▶ von denen gewisse Knotenpaare durch **Kanten** $(i, j) \in \mathcal{E}$ (engl. *edge*) verbunden sind.

Zusammenhangskomponenten

Als eine **Zusammenhangskomponente** von \mathbf{G} bezeichnen wir einen Teilgraphen \mathbf{G}_0 ,


- ▶ in dem jeder Knoten von \mathbf{G}_0 durch einen Pfad mit jedem anderen Knoten von \mathbf{G}_0 verbunden ist,
- ▶ und zugleich mit keinem Knoten außerhalb von \mathbf{G}_0 verbunden ist.

Zusammenhangskomponenten

Als eine **Zusammenhangskomponente** von \mathbf{G} bezeichnen wir einen Teilgraphen \mathbf{G}_0 ,

- ▶ in dem jeder Knoten von \mathbf{G}_0 durch einen Pfad mit jedem anderen Knoten von \mathbf{G}_0 verbunden ist,
- ▶ und zugleich mit keinem Knoten außerhalb von \mathbf{G}_0 verbunden ist.

So hat z.B. der folgende Graph 3 Zusammenhangskomponenten:



gerichtet vs. ungerichtet

- ▶ Eine Kante (i, j) fassen wir als Kante „von i nach j “ auf.
- ▶ Gilt für jede Kante $(i, j) \in \mathcal{E}$ auch $(j, i) \in \mathcal{E}$,
so ist der Graph **ungerichtet** (zähle jedes Kantenpaar $(i, j), (j, i)$ als eine ungerichtete Kante).
- ▶ Andernfalls **gerichtet**.

Inzidenzmatrix

Endlicher *gerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

- ▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$
- ▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Inzidenzmatrix

Endlicher *gerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$

▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Die (**gerichtete**) Inzidenzmatrix $Q \in \mathbb{R}^{k \times n}$ von \mathbf{G} hat Einträge

$$q_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{Kante } e_i \text{ geht von } v_j \text{ aus} \\ -1, & \text{Kante } e_i \text{ geht nach } v_j \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Inzidenzmatrix

Endlicher *gerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

- ▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$
- ▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Die (*gerichtete*) Inzidenzmatrix $Q \in \mathbb{R}^{k \times n}$ von \mathbf{G} hat Einträge

$$q_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{Kante } e_i \text{ geht von } v_j \text{ aus} \\ -1, & \text{Kante } e_i \text{ geht nach } v_j \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Beobachtung:

Jede Zeile hat genau einmal $+1$ und genau einmal -1 .

Inzidenzmatrix

Satz 1

Der gerichtete Graph \mathbf{G} habe n Knoten.

1. Ist \mathbf{G} zusammenhängend, so ist

$$\text{Rang}(Q) = n - 1.$$

2. Falls \mathbf{G} aus k Zusammenhangskomponenten besteht, so gilt

$$\text{Rang}(Q) = n - k.$$

ungerichtete Inzidenzmatrix

Endlicher *ungerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

- ▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$
- ▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

ungerichtete Inzidenzmatrix

Endlicher *ungerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$

▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Die (**ungerichtete**) Inzidenzmatrix $M \in \mathbb{R}^{k \times n}$ von \mathbf{G} hat Einträge

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{Kante } e_i \text{ geht von oder nach } v_j \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

ungerichtete Inzidenzmatrix

Endlicher *ungerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$

▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Die (**ungerichtete**) Inzidenzmatrix $M \in \mathbb{R}^{k \times n}$ von \mathbf{G} hat Einträge

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{Kante } e_i \text{ geht von oder nach } v_j \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Satz 2

Sei \mathbf{G} zusammenhängend. Ist \mathbf{G} ein *bipartiter* Graph, so ist

$$\text{Rang}(M) = n - 1,$$

andernfalls

$$\text{Rang}(M) = n.$$

Adjazenzmatrix

Endlicher *ungerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

- ▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$
- ▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Adjazenzmatrix

Endlicher *ungerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$

▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Die **Adjazenzmatrix** $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ von \mathbf{G} hat Einträge

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{falls } (i, j) \in \mathcal{E} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Adjazenzmatrix

Endlicher *ungerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$

▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$


Die **Adjazenzmatrix** $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ von \mathbf{G} hat Einträge

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{falls } (i, j) \in \mathcal{E} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Beobachtung:

A ist symmetrisch, da A ungerichtet.

Adjazenzmatrix



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{7 \times 7}.$$

Adjazenzmatrix

Satz 2

Der (i, j) -Eintrag von A^s gibt die Anzahl der Wege der Länge s von i nach j an.

Laplace-Matrix

Endlicher *ungerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

- ▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$
- ▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Laplace-Matrix

Endlicher *ungerichteter* Graph $\mathbf{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$:

- ▶ $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$
- ▶ $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_k\}$

Die **Laplace-Matrix** $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ des Graphen \mathbf{G} hat die Einträge

$$l_{ij} := \begin{cases} d_i, & \text{falls } i = j \text{ und genau } d_i \text{ Kanten } (i, k) \text{ von } i \text{ ausgehen} \\ -1, & \text{falls } i \neq j \text{ und die Kante } (i, j) \in \mathcal{E} \text{ existiert} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$


Laplace-Matrix

Beobachtung:

$$\begin{aligned}L &= D - A \\ &= Q^T \cdot Q\end{aligned}$$

Dabei ist $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, A die Adjazenzmatrix und Q die Inzidenzmatrix (für beliebige Kantenrichtungen auf \mathbf{G}).

Laplace-Matrix



$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{7 \times 7}.$$

Laplace-Matrix

Satz 3

1. Die Laplace-Matrix L ist symmetrisch, diagonalisierbar und alle Eigenwerte sind nicht negativ: $0 = \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_k$.
2. Der Vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ ist ein Eigenvektor von L zum Eigenwert $\lambda_1 = 0$.
3. Für jeden Eigenwert λ von L mit Eigenvektor v gilt

$$\lambda = \frac{v^T \cdot L \cdot v}{v^T \cdot v} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n v_i^2} \cdot \left(\sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} (v_i - v_j)^2 \right).$$

4. Die algebraische Vielfachheit des Eigenwertes $\lambda_1 = 0$ ist die Anzahl der zusammenhängenden Komponenten von \mathbf{G} .