

# Tag der Mathematik 2015

## Gruppenwettbewerb

### Allgemeine Hinweise:

Als Hilfsmittel dürfen nur Schreibzeug, Geodreieck und Zirkel benutzt werden. Taschenrechner sind nicht zugelassen.

Teamnummer	Name und Vorname eines Teammitglieds

Die folgende Tabelle wird von den Korrektoren ausgefüllt.

Aufgabe	G 1	G 2	G 3	G 4	Summe
Mögliche Punktzahl	9	9	9	9	36
Erreichte Punktzahl					

Teamnummer	Name und Vorname eines Teammitglieds

## Aufgabe G 1 (9 Punkte)

Die Folge  $a_0, a_1, a_2, \dots$  rationaler Zahlen wird nach folgender Vorschrift gebildet:

$$\begin{aligned} a_0 &= 10, \\ a_{n+1} &= a_n + 2, \text{ falls } n \text{ gerade,} \\ a_{n+1} &= \frac{3}{a_n}, \text{ falls } n \text{ ungerade.} \end{aligned}$$

- a) Bestimmen Sie  $a_0, \dots, a_{10}$ .
- b) Bestimmen Sie die Differenz von Zähler und Nenner von  $a_{10000}$ , wenn dieser Bruch in gekürzter Form vorliegt.  
Begründen Sie (wie immer) Ihr Ergebnis.

### Lösung

Die Zahlenfolge beginnt mit

$n$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$a_n$	10	12	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{29}{10}$	$\frac{30}{29}$	$\frac{88}{29}$	$\frac{87}{88}$

Man sieht, dass für gerades  $n \geq 4$  Zähler und Nenner sich nur um  $\pm 1$  unterscheiden. Das wird nun verifiziert:

Sei  $a_{2k} = \frac{x+1}{x}$ . Dann gilt

$$a_{2k+2} = \frac{3}{a_{2k+1}} = \frac{3}{a_{2k} + 2} = \frac{3x}{3x + 1}.$$

Es folgt

$$a_{2k+4} = \frac{3}{a_{2k+2} + 2} = \frac{3(3x + 1)}{3x + 2(3x + 1)} = \frac{9x + 3}{9x + 2},$$


also ist von  $a_4$  beginnend alle vier Schritte der Zähler 1 größer als der Nenner.

Da 10000 durch 4 teilbar ist, gilt auch für  $a_{10000}$ : Zähler minus Nenner = 1.

Teamnummer	Name und Vorname eines Teammitglieds

## Aufgabe G 2 (9 Punkte)

Ein Quadrat  $ABCD$  hat im  $x$ - $y$ -Koordinatensystem die Ecken  $A(0 | 0)$ ,  $B(2 | 0)$ ,  $C(2 | 2)$  und  $D(0 | 2)$ . Sei  $P(a | b)$  der von  $D$  verschiedene Schnittpunkt der Kreise durch  $D$  mit Mittelpunkten in  $C$  bzw.  $E(0 | 1)$ .



Zeigen Sie, dass das Verhältnis der Streckenlängen  $PB$  und  $PA$  genau  $\sqrt{2}$  beträgt.

### Lösung

Da  $P$  auf dem Kreis mit Radius 1 um  $E$  liegt, gilt

$$a^2 + (1 - b)^2 = 1.$$

Daher gilt  $AP^2 = a^2 + b^2 = 2b$ .

Analog liegt  $P$  auf dem Kreis mit Radius 2 um  $C$ , was

$$(2 - a)^2 + (2 - b)^2 = 4$$

nach sich zieht.

Das zeigt  $BP^2 = (2 - a)^2 + b^2 = 4b$ , und da  $b$  nicht 0 ist, folgt

$$BP : AB = \sqrt{2}.$$

Teamnummer	Name und Vorname eines Teammitglieds

---

### Aufgabe G 3 (9 Punkte)

Die Klasse 10 hat zum Schulfest ein Glücksrad gebaut, um die Klassenkasse aufzufüllen. Die darauf zu erreichenden Zahlen 1 bis 5 sind alle gleich wahrscheinlich.

Der Spieler zahlt 1 Euro Einsatz und darf dafür das Rad drei Mal drehen. Anschließend erhält er für jede 1 einen Euro.

- Welchen Gewinn (Einsatz minus Auszahlung) darf die Klasse pro Spiel erwarten?
- Für drei Einsen soll eine Sonderausschüttung erfolgen, die das Spiel fair macht, der erwartete Gewinn also 0 ist.

Wie hoch muss diese sein?

#### Lösung

a) Die Wahrscheinlichkeit für keine 1 ist  $(4/5)^3$ . Die für eine Eins ist  $3 \cdot 4^2/5^3$ , die für 2 Einsen ist  $3 \cdot 4/5^3$ , und die für drei Einsen ist  $1/5^3$ .

Der erwartete Gewinn ist also (Rechnung in Euro)

$$1 - \frac{48}{125} - \frac{24}{125} - \frac{3}{125} = 50/125 = 0,4.$$

Das sind 40 Cent.

b) Um die Fairheit des Spieles mit der genannten Maßnahme zu erreichen, müsste bei 3 Einsen ein Betrag von  $S$  bezahlt werden, wobei

$$1 - \frac{48}{125} - \frac{24}{125} - \frac{S}{125} = 0.$$

Es folgt

$$S = 125 - 48 - 24 = 53.$$

Es müssten also zusätzlich zu den 3 regulären Euro noch 50 Euro als Sonderausschüttung gezahlt werden.

Teamnummer	Name und Vorname eines Teammitglieds

---

### Aufgabe G 4 (9 Punkte)

Im  $x$ - $y$ -Koordinatensystem sei  $P(a \mid a^2)$ ,  $a > 0$ , ein Punkt auf der Parabel, die durch  $y = x^2$  gegeben ist.

Die Tangente an dieser Parabel im Punkt  $P$  schneide die  $x$ -Achse in  $Q(q \mid 0)$ .

Die Fläche zwischen der Parabel, der  $x$ -Achse und der Tangente wird durch die Gerade mit der Gleichung  $x = q$  in zwei Teilflächen  $A_1$  und  $A_2$  unterteilt.

Zeigen Sie, dass  $A_1$  und  $A_2$  gleichen Flächeninhalt haben.

#### Lösung

Die Steigung der Tangente in  $P$  ist  $2a$ . Es folgt

$$a^2 = 2a \cdot (a - q),$$

also

$$q = a/2.$$

Der Flächeninhalt von  $A_1$  ist daher

$$\int_0^{a/2} x^2 dx = x^3/3 \Big|_0^{a/2} = \frac{a^3}{24}.$$

Der Inhalt von  $A_2$  ist

$$\int_{a/2}^a (x^2 - 2a(x - \frac{a}{2})) dx = \int_{a/2}^a (x - a)^2 dx = \int_{-a/2}^0 x^2 dx = \int_0^{a/2} x^2 dx = \frac{a^3}{24}.$$